



ONLINE ANBAULEITFADEN

	VEGETATIVE PHASE				GENERATIVE PHASE						
	WURZEL-BILDUNG	I	II		I			II	III	IV	
TAGE UND WOCHEN	T1-5	T6-25	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9
LICHTSTUNDEN	18	18	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Dosierung in ml per 10 L											
CANNA HYDRO VEGA A (SW)	24 - 31	28 - 35	28 - 35	28 - 35							
CANNA HYDRO VEGA B (SW)	24 - 31	28 - 35	28 - 35	28 - 35							
CANNA HYDRO FLORES A (SW)					28 - 35	28 - 35	28 - 35	28 - 35	24 - 32	21 - 28	
CANNA HYDRO FLORES B (SW)					28 - 35	28 - 35	28 - 35	28 - 35	24 - 32	21 - 28	
CANNA RHIZOTONIC	40	20	20	20	5	5	5	5	5		
CANNAZYM		25	25	25	25	25	25	25	25	25 - 50 *	25 - 50
CANNABOOST			20 **	20	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40
CANNA PK 13/14								15			
CANNA CALMAG AGENT ***	0 - 4	0 - 4	0 - 4	0 - 4	0 - 4	0 - 4	0 - 4	0 - 4	0 - 4	0 - 4	0 - 4
CANNA FLUSH									40		40
mS/cm											
EC WASSER ***	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
EC DÜNGER	1,4 - 1,8	1,6 - 2,0	1,6 - 2,0	1,6 - 2,0	1,6 - 2,0	1,6 - 2,0	1,6 - 2,0	2,0 - 2,5	1,4 - 1,8	1,2 - 1,6	
EC GESAMT	1,6 - 2,0	1,8 - 2,2	1,8 - 2,2	1,8 - 2,2	1,8 - 2,2	1,8 - 2,2	1,8 - 2,2	2,2 - 2,7	1,6 - 2,0	1,4 - 1,8	0,2

Dieser Anbauschema ist für Pflanzen gedacht, die Blüten oder Früchte entwickeln, ausgehend von einem einwöchigen Steckling oder Sämling. Die Dauer der einzelnen Phasen kann je nach Art variieren.

- \* CANNAZYM-Dosierung auf 50 ml/10 L verdoppeln, wenn das Substrat wiederverwendet wird.
- \*\* CANNABOOST für zusätzliche Stärke während der Blüte auf maximal 40 ml/10 L erhöhen.
- \*\*\* Die Dosierung von CANNA CALMAG AGENT hängt vom EC-Wert des Wassers ab, der idealerweise zwischen 0,2-0,4 mS/cm sein sollte. Wenn das Ausgangswasser einen EC-Wert von 0,0 hat, kann Calmag mit der maximalen Dosierung gegeben werden, um einen EC-Wert von 0,4 mS/cm zu erreichen. Wenn der EC-Wert des Ausgangswassers bereits über 0,0 liegt, sollte eine geringere Calmag-Dosis verwendet werden. Dieses Beispielschema geht von Wasser mit einem EC-Wert von 0,2 mS/cm aus (angepasst mit Calmag).

Für eine längere Wachstumsphase die empfohlenen Dosierungen aus der vegetativen Phase I (T6-25) wiederholen.  
Für eine längere Blütephase die empfohlenen Dosierungen aus der generativen Phase I (W3-W5) Wiederholen.  
CANNA PK 13/14 3-4 Wochen vor der Ernte hinzugeben.  
Der empfohlene pH-Wert liegt zwischen 5,2 und 6,2

